

# SCAPHIDIIDES NOUVEAUX

DE DIVERSES ORIGINES

PAR MAURICE PIC

---

Les présentes nouveautés m'ont été communiquées par le D.<sup>r</sup> Gestro qui, autrefois, a décrit quelques espèces de Scaphidiides <sup>(1)</sup> et les types font partie des riches collections du Musée civique de Gènes.

**Scaphidium** (s. g. nov. **Cribroscahium**). — *Articulis 5 ultimis antennarum elongatis, parum crassis; elytris in disco punctato-cribratis et irregulariter striatis; thorace postice in lobo impresso.*

Sous-genre caractérisé par la forme des antennes, la sculpture particulière des élytres et le lobe impressionné du prothorax.

**Cribroscahium irregulare** n. sp. — *Oblongum, nitidum, nigrum, rufo tinctum, antennis ad basim, pedibus et abdomine apice pro parte rufis, elytris rufis, ad humeros et ad medium lateraliter nigro maculatis.*

Oblong, rétréci aux deux extrémités, noir, teinté de roux par places, avec la base des antennes, les pattes et partie du sommet de l'abdomen roux, élytres roux, bimaclés de noir latéralement. Antennes pas très longues et grêles, 4 avant-derniers articles un peu épaissis et rembrunis, le terminal étant plus clair et subovalaire; yeux gros et saillants, un peu rapprochés; prothorax assez long, très rétréci en avant; peu ponctué, à ligne basale de points nette et complète; avec une impression sur le lobe; élytres courts, atténués postérieurement, à rangées de points transversaux sur la base et irrégulièrement ponctués au sommet avec, sur chacun,

(1) Ann. Mus. Civ. Genova, XIV, 1879, p. 559-561 et XV, 1879, p. 50-57.

en outre de la strie suturale, 4 stries, plus ou moins longues, criblées de gros points; pattes longues, tibias un peu arqués.

Long. 7 mm. Sumatra occid.: Siboga (D.<sup>r</sup> E. Modigliani).

Espèce très remarquable par sa structure élytrale.

**Scaphidium rufitarse** v. nov. **Modiglianii**.

*Thorace antice rufo, postice late nigro.*

Sumatra occid.: Si Rambé (D.<sup>r</sup> E. Modigliani).

Diffère du type par la coloration noire très étendue du prothorax, celle ci couvrant presque la moitié postérieure de cet organe.

**Scaphidium striatum** n. sp. (1). — *Oblongo-ovatum, nitidum, testaceum, antennis pro parte nigris, thorace elytrisque nigro maculatis.*

Oblong-ovalaire, brillant, testacé, maculé de noir sur le prothorax et les élytres, antennes à massue foncée avec le dernier article flave. Yeux grands, assez rapprochés; antennes à massue assez épaissie; prothorax peu long, très rétréci en avant, marqué d'une ligne postérieure arquée et médiocrement ponctuée, orné, de chaque côté, d'une petite tache noire et sur le milieu, d'une grande macule bifide également noire, prolongée sur la base; élytres pas très larges et assez courts, un peu atténués postérieurement, ayant, en outre de la strie suturale, 3 fortes stries discales médiocrement ponctuées, l'interne étant plus courte, maculés de noir transversalement à la base et en arc au sommet avec une autre macule noire raccourcie médiane et externe; pattes assez longues, testacées, tibias en partie rembrunis.

Long. 5 mm. Java: Buitenzorg, 1897. (Prof. O. Penzig).

Peut se placer près de *striatipenne* Gestro qui a six rangées inégales de stries.

**Cyparium Grilloi** n. sp. — *Subovatum, nitidum, castaneum, antennis pro parte capiteque antice testaceis, pedibus pygidioque pro parte testaceis aut rufescentibus.*

Subovalaire, brillant, châtain avec le devant de la tête, partie des membres et de l'abdomen testacés ou roussâtres. Tête presque lisse, plus claire en avant, yeux gris; écartés; antennes testacées à massue, à l'exception du dernier article, qui est testacé, rem-

(1) Cette espèce et *Toxidum cinctum* figurent aussi dans la coll. Pic.

brunie; prothorax pas très court; un peu rétréci en avant, à ponctuation assez forte et écartée au milieu; élytres peu longs, subarqués sur les côtés, un peu rétrécis en arrière, fortement ponctués avec des rangées régulières de points sur le disque, strie suturale peu prolongée sur la base; pattes d'un testacé roussâtre; abdomen en majeure partie testacé-roussâtre.

Long. 4,5 mm. Brésil: Palmeira dans le Paraná, 1890 (D.<sup>r</sup> G. Franco Grillo).

Diffère de *C. Gounellei* Pic par la ponctuation bien distincte du prothorax, les élytres différemment ponctués, le pygidium plus clair.

**Amalocera Doriai** n. sp. — *Subovata*, *nitida*, *rufo-castanea*, *pro parte pallidior*, *antennis ad basim pedibusque testaceis*.

Subovalaire, brillant, roux chatain mais de coloration plus pâle sur une partie du dessus et en dessous, base des antennes et pattes testacés. Tête assez petite, yeux gris, grands et fortement granulés; prothorax grand, assez long, rétréci en avant, chatain mais plus clair sur son pourtour, à ponctuation fine espacée, écusson très petit, peu visible; élytres de la largeur du prothorax, courts, un peu rétrécis en arrière, subtronqués au sommet avec les angles arrondis, ayant quelques gros points médiocres espacés sur le disque, strie suturale forte, longuement prolongée sur la base; pattes médiocres.

Long. 2 mill. environ. Bornéo: Sarawak, 1865-66 (G. Doria).

Voisin de *A. suturalis* Ach., mais avec l'angle sutural non dentiforme, la strie suturale régulière et la ponctuation différente.

**Scaphosoma Modiglianii** n. sp. — *Subovatum*, *nitidum*, *nigrum*, *elytris apice testaceis*, *antennis pedibusque testaceis*.

Subovalaire, brillant, noir avec le sommet des élytres assez étroitement bordé de testacé et les membres de cette dernière coloration. Yeux gris, écartés, grands et fortement granulés; prothorax pas très long, rétréci en avant, assez fortement et plus ou moins éparsément ponctué; élytres courts, subarqués sur les côtés, un peu rétrécis à l'extrémité, tronqués au sommet, irrégulièrement et éparsément ponctués sur le disque, strie suturale forte, s'effaçant en avant; cuisses courtes.

Long. 2 mm. environ. Sumatra occid. : Si Rambé. Décembre 1910 à Mars 1911 (D.<sup>r</sup> E. Modigliani).

Très voisin de *S. latemaculatum* Pic, par sa forme et sa structure, mais élytres de coloration bien différente.

**Scaphosoma phalacroide** n. sp. — *Ovatum, convexum, nitidum, parum et irregulariter punctatum, nigrum, elytris apice rufescentibus, capite antice, antennis ad basim, pedibus et abdomine apice testaceis aut rufis.*

Ovale, très rétréci postérieurement, convexe, brillant, peu et irrégulièrement ponctué, noir, élytres un peu roussâtres au sommet, devant de la tête et base des antennes testacés, pattes et sommet de l'abdomen roussâtres. Yeux gris, assez gros, un peu échancrés; prothorax court, rétréci en arc antérieurement; élytres courts et larges, très atténués en arrière, irrégulièrement ponctués, strie suturale bien marquée, longuement prolongée sur la base; pattes pas très longues.

Long. 2 mm. environ. Brésil: Santos, décembre 1908 (D.<sup>r</sup> A. Andreini).

Voisin de *S. tropicum* Kirsch, avec une forme plus convexe et très rétrécie postérieurement, forme qui le rend facile à reconnaître.

**Scaphosoma tropicum** v. nov. **Andreinii**. — *Oblongo-ovatum, nigrum, elytris piceis, capite antice, antennis, pedibus abdomineque apice testaceis, elytris postice rufo marginatis, distincte punctatis, stria suturali ad basim parum prolongata.*

Long. 2 mm. environ. Brésil: Santos: décembre 1908 (D.<sup>r</sup> A. Andreini).

Diffère au moins de *S. tropicum* Kirsch par la coloration de la tête et de l'abdomen en partie claire; en outre, très distinct du précédent par la forme du corps, le dessus moins convexe et la ponctuation plus marquée.

**Pseudoscaphosoma maculatum** n. sp. — *Subovatum, parum nitidum, rufo-testaceum, infra corpore pro parte nigro, elytris nigro notatis, membris testaceis.*

Subovale, peu brillant, roux-testacé, dessous du corps en

partie noir, élytres maculés de noir, membres testacés. Yeux médiocres: prothorax court, rétréci en avant, peu ponctué; élytres assez larges et peu longs, un peu élargis vers le milieu puis rétrécis en arrière, tronqués au sommet, assez fortement ponctués sur le disque, roux avec le sommet plus clair, ornés d'une macule basale et d'une autre postmédiane noires, celles-ci étroitement jointes latéralement, strie suturale forte et peu recourbée sur la base; dessous foncé, sommet de l'abdomen et pygidium testacé; pattes testacées.

Long. près de 3 mm. Bornéo: Sarawak 1865-66 (G. Doria).

Voisin de *P. niasense* Pic, plus roux avec la suture non foncée au milieu, les élytres plus fortement ponctués, etc.

**Pseudoscaphosoma testaceomaculatum** v. nov. **conjunctum**. —

*Maculis testaceis elytrorum junctis.*

Cette variété est caractérisée par les deux macules testacées des élytres dilatées et jointes sur chacun de ces organes.

Sumatra occid.: Si Rambé, décembre 1910 à mars 1911 (D.<sup>r</sup> E. Modigliani).

**Toxidium cinctum** Pic. <sup>(1)</sup>. — *Angustatum, nitidum, rufum, pro parte testaceum, thorace antice et postice et infra corpore pro majore parte nigris, elytris nigro cinctis.*

Étroit, brillant, roux, testacé par places, antennes, bords antérieurs et postérieurs du prothorax et majeure partie du dessous noirs, élytres bordés de foncé. Antennes testacées à la base, obscurcies à l'extrémité, très longues; yeux gris, assez grands, peu échancrés et écartés; prothorax long et étroit, rétréci en avant, finement ponctué; élytres longs et étroits, un peu rétrécis postérieurement, tronqués au sommet, médiocrement et éparsément ponctués, strie suturale fine, courtement prolongée à la base; dessous du corps foncé avec l'abdomen plus ou moins roux; pattes pas très longues.

Long. 3 mm. Sumatra occid.: Si Rambé, décembre 1890 à mars 1891 (D.<sup>r</sup> E. Modigliani).

Espèce très reconnaissable à sa forme étroite et allongée, ainsi qu'à sa coloration particulière avec le prothorax et les élytres en partie bordés de foncé.

<sup>(1)</sup> La diagnose de cette espèce figure dans le N.<sup>o</sup> 402 de l'Echange.